



KAMILLIN EXTERN ROBUGEN

- ist ein **pflanzliches Arzneimittel** mit dem Wirkstoff **Kamillenblütenextrakt**.
- 100g **KAMILLIN EXTERN ROBUGEN** enthalten die Wirkstoffe aus bis zu **50g** Kamillenblüten mit Levomenol, Apigenin, Matricine, En-In-Dicycloether.
- Kamillenblütenextrakt wirkt als Antiphlogistikum entzündungshemmend und granulationsfördernd auf geschädigtes Zellgewebe der Haut.
- wird **äußerlich angewendet für feuchte Umschläge**, zu Waschungen oder Spülungen bei entzündlichen Haut- und Schleimhauterkrankungen (z. B. Ekzeme); bei Entzündungen im Analbereich und der Geschlechtsorgane.
- wird hergestellt aus **hochwertigen Kamillensorten aus kontrolliertem Anbau***

H23257W ::

***Qualität aus Deutschland:** Um eine gleich bleibende Wirkung dieses Naturproduktes sicherzustellen, verwenden wir nur unsere geschützten Spezial-Kamillensorten, die unter unserer ständigen Kontrolle (in Thüringen) angebaut werden. Von der Selektion und Anzucht des Saatgutes, der Ernte der Kamillenblüten bis zur Extraktion (in Esslingen) überwachen wir die gesamte Produktion und den Kreislauf dieses Arzneimittels aus nachwachsenden Rohstoffen. Auf diese Weise können wir eine gleich bleibende optimale Zusammensetzung der Wirkstoffe in unseren Kamillenblüten und damit in unserem **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** sicherstellen.

KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN Wirkstoff: Kamillenblüten-Auszug. **Zusammensetzung:** 1 ml Flüssigkeit enthält 942 mg Auszug aus Kamillenblüten (1:2,0-2,8). Auszugsmittel: Propan-2-ol 48% (V/V). Die sonstigen Bestandteile sind: Gereinigtes Wasser, Macroglycoläther (Ph. Eur.) und Natriumhydroxid-Lösung 50% (m/m). **Anwendungsgebiete:** **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung von Reizungen der Haut und der Schleimhäute im Anal- und Genitalbereich, nachdem ernsthafte Erkrankungen durch einen Arzt ausgeschlossen worden sind und zur Behandlung von leichten Entzündungen der Haut (Sonnenbrand), oberflächlichen Wunden und kleinen Furunkeln. **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** wird äußerlich angewendet als Zusatz für Umschläge, Spülungen, Teil-, Sitz- und Vollbäder. Das Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist. Der Anwender soll bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren. **Gegenanzeigen:** **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** darf nicht angewendet werden: wenn Sie allergisch gegen Kamille, gegen andere Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind, im Bereich der Augen, zur Inhalation oder zu Darmspülungen. Teil- und Sitzbäder, Umschläge und Spülungen dürfen nicht durchgeführt werden bei: offenen Wunden, größeren Hautverletzungen und akuten Hauterkrankungen, hohem Fieber und schweren Infektionen. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat. Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Es können für diese Patientinnen keine Untersuchungen und dokumentierte klinische Erfahrungen vorliegen. Für Schwangere und Stillende wird die Anwendung von **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** nicht empfohlen. Aus diesem Grund soll das Präparat bei Schwangerschaft und Stillzeit nur nach ärztlicher Therapievorgabe angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Sehr selten (kann bis zu 1 Behandelten von 10 000 betreffen) können Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Kontaktallergien) auftreten, auch bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen andere Korbblütler (z.B. Beifuß) wegen so genannter Kreuzreaktionen. Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar): Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich schwerer allergischer Reaktionen (mit Atemnot, Quincke-Ödem, Kreislaufkollaps, Anaphylaktischer Schock) nach Schleimhautkontakt. **Dosierung: Jugendliche ab 12 Jahren, Erwachsene und Senioren** Teil- und Sitzbad: 20-40 ml (½-1 Portionsbeutel, 4-8 Messbecher) auf 20-40 l Wasser, einmal täglich. Vollbad: 30 ml (¾ Portionsbeutel, 6 Messbecher) auf 150 l Wasser, einmal täglich. Umschläge und Spülungen: 20 ml (½ Portionsbeutel, 4 Messbecher) auf 1 l Wasser, ein- bis mehrmals täglich. **Kinder (4 Wochen bis 11 Jahre)** Teil- und Sitzbad: 10-20 ml (¼-½ Portionsbeutel, 2-4 Messbecher) auf 10-20 l Wasser, einmal täglich. Ein Vollbad ist nicht vorgesehen. Verwenden Sie pro Tag nicht mehr als 60 ml **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN**. **Frühgeborene, Neugeborene unter 4 Wochen** **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** soll bei diesen Personengruppen nicht angewendet werden wegen fehlender klinischer Daten (siehe Abschnitt 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von **KAMILLIN® EXTERN ROBUGEN** beachten). Badetemperatur handwarm (30-34°C), Badedauer: 10-12 Minuten.

Packungsgrößen: 240 ml mit 6 Portionsbeutel a 40 ml (PZN 0329272); 400 ml mit 10 Portionsbeutel a 40 ml (PZN 0329289); 1000 ml mit 25 Portionsbeutel a 40 ml (PZN 0329303)

Reg.-Nr.: 2202236.00.00

Stand der Information: November 2022